



Grandes Cultures

désherbage pour la qualité de l'eau, maladies et parasites

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°36 du 03 mai 2001 - 1 page

RAVAGEURSET MALADIES

COLZA

Stades : de G2 à G4.

Ravageurs :

Les vols de **charançons des siliques**, enregistrés en cuvette, se sont plus manifestés cette semaine à la faveur de quelques éclaircies. L'activité sur les plantes est restée modérée ;

Préconisations : continuer à surveiller les parcelles non protégées en privilégiant les après-midi ensoleillés et sans vent. Intervenir dès que les populations dépassent 1 charançon en moyenne pour 2 plantes (comptage à une dizaine de mètres de la bordure) Utiliser un insecticide homologué qui bénéficie de la mention : " emploi autorisé durant la floraison... " en évitant les heures de butinage des abeilles.

Maladies :

Le risque **sclerotinia** est minimisé par les températures relativement peu élevées de cette période. Pour les parcelles à risque, qui n'auraient pas encore été traitées, l'intervention présente désormais peu d'intérêt, surtout pour les parcelles proches du stade G4. En effet, la curativité des produits présents sur le marché n'excède guère 7 jours.

CEREALES

Stades les plus courant : 2 nœuds à ligule de la dernière feuille visible

Maladies :

Blé d'hiver :

Septoriose :

Si le piétin est maintenant bien installé et facilement reconnaissable, c'est le suivi du risque septoriose qui va orienter les choix de protection fongicide. Les observations montrent des symptômes fréquents sur les F2, soit souvent les F3 définitives. La variété Apache se montre actuellement la moins touchée.

Préconisations :

- Parcelles au stade 2 nœuds ou plus, non encore protégées : intervenir très rapidement, avec un produit mixte curatif et préventif, à pleine dose.

- Pour les variétés sensibles déjà protégées, renouveler la protection 3 à 4 semaines après la première intervention.

- pour les situations plus tardives ou à 2 nœuds mais relativement peu touchées, l'intervention peut être différée.

Rouille Brune :

Les débuts d'attaque enregistrés la semaine dernière n'ont pas évolué.

Orged'hiver :

Stade sortie des barbes pour les parcelles les plus précoces ;

L' **helminthosporiose** reste la maladie dominante.

Préconisations :

une seconde intervention est à réaliser prochainement, au plus tard à la sortie des barbes.

Triticale :

Un foyer de **rouille jaune** est observé sur la variété Ampiac à Marpiré (35). Il convient de rester très vigilant vis à vis de cette maladie qui voit se développer périodiquement des nouvelles souches.

Du fait de son développement explosif (surtout pluie et vent), intervenir sans attendre lorsque des symptômes sont observés : pustules jaunes, alignées, plus petites que la rouille brune.

Si vous observez des attaques, contactez-nous et envoyez-nous des échantillons.




Prochain bulletin : le 10 mai 2001



Assurer une protection contre la septoriose.
Vigilance vis à vis de la rouille jaune.

Pourcentage moyen d'attaque sur les parcelles du réseau



1/1

P36